

พื้นคอกหมูหลุม

ขนาดของคอก

กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 90 เซนติเมตร

ส่วนผสม

1. ขี้เลื่อย หรือ แกลบหยาบ (แกลบคั่ว) 100 กระสอบ (บางคอกอาจไม่ถึง 100 กระสอบ)
2. เกลือ 9-10 กิโลกรัม
3. ดิน (ดินที่ขุดออก) 10 กระสอบ

วิธีการทำ

แบ่งหรือวัดพื้นคอกออกเป็น 3 ชั้น ชั้นละ 30 เซนติเมตร ชั้นที่หนึ่ง

1. เทแกลบหรือขี้เลื่อยลงไปสูงประมาณ 25-27 เซนติเมตร
2. โรยดินให้ทั่วสูงประมาณ 3-5 เซนติเมตร
3. โรยเกลือประมาณ 3 กิโลกรัม
4. รดน้ำหนักทั้ง 3 ชนิด ชนิดละ 1 บัว (2 ชั้นต่อน้ำ 10 ลิตร) ชั้นที่สองและที่สาม ทำเหมือนชั้นแรกทุกอย่าง



การเลี้ยงหมูหลุม

ข้อดีการเลี้ยงหมูหลุม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มรายได้ สามารถเลี้ยงในชุมชนได้ ขี้หมูไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่แฉะแฉะ ไม่มีแมลงวันรบกวนพื้นคอกสามารถนำไปจำหน่ายได้ประหยัดต้นทุนอาหาร สำเร็จรูปได้ถึง 70%



จุลินทรีย์จากผลไม้ (ลดปัญหากลิ่นอุจจาระหมู)

วัสดุอุปกรณ์

1. ผลไม้สุก เช่น มะละกอ มะม่วง มะเฟือง เป็นต้น 1 กิโลกรัม
2. น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม

3. กระดาษขาว

4. เชือกฟาง

๖วิธีการทำ

1. นำผลไม้ที่เตรียมไว้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นำใส่ในโหล

2. เทน้ำตาลทรายแดงลงไปโหล (ให้เหลือน้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยเพื่อนำไปโรยปิดทับ)

3. ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

4. นำน้ำตาลทรายแดงที่เหลือโรยปิดทับอีกครั้งหนึ่ง

5. ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน

๖วิธีการใช้

2 ซ้อนต่อน้ำ 10 ลิตร ให้หมูกินหรือใช้รดน้ำผัก ผลไม้



จุลินทรีย์ราขาวจากป่าไผ่ (ลดปัญหากลิ่นเหม็นของจุกจากรหมู)

๖วัสดุอุปกรณ์

1. กระดาษเพาะเชื้อราขาวสีเหลืองมกกว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 10 ซม. เจาะรูด้านล่าง 10 รู

2. น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม

3. ลวดตาข่ายหรือตะแกรง

4. กระดาษขาว

5. เชือกฟาง

6. ผ้ายางพลาสติก

7. ข้าวเจ้าสุก(ข้าวหุง) 1 ลิตร ทิ้งไว้ให้เย็น

8. โหลแก้วหรือโหลพลาสติก

9. ทัพพีตักข้าว

๖วิธีการทำ

1. ตักข้าวหุงด้วยทัพพีใส่ในกระเบสูงประมาณ 7 ซม. ไม่ต้องกด

2. ปิดด้วยกระดาษขาวผูกเชือกให้แน่น

3. นำพลาสติกคลุมและนำลวดตาข่ายปิดทับอีกที่ผูกเชือกให้แน่น

4. เชื้อไปไผ่บริเวณกอไผ่เพื่อหาเชื้อราขาว

5. นำกระเบที่ทำไว้แล้ววางบริเวณที่ทำการเชื้อราขาวแล้วคลุมด้วยใบไผ่

6. รดน้ำให้ชุ่ม ประมาณ 1 บัว ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน

7. นำเชื้อราขาวที่ได้ในกระเบผสมกับน้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม

8. นำใส่ในโหลปิดด้วยกระดาษขาว ผูกเชือกให้แน่น

9. หมักทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน

๖วิธีการใช้

2 ซ้อนต่อน้ำ 10 ลิตร ให้รดที่พื้นคอกและตัวหมู ทุกเช้าและเย็น

